

<b>VIRUSZIEKTEN</b>	<b>BESMETTING</b>	<b>VERSCIJNSELEN</b>	<b>BEHANDELING</b>	<b>VACCINATIE</b>	<b>OPMERKINGEN</b>
Hondenziekte Carré (Fr.) Distemper (G.B.) Staupe (Dts) Ontdekt door 1905 Carré	Lichaamsvloeistof Neus/oog vocht Urine Lucht	Snotneus, tranen, hoesten, gebrek aan eetlust, koorts, longontsteking, diarree, braken, etterblaasjes op de huid Hersenverschijnselen	Zo snel mogelijk	5/6 weken 12 weken elk jaar	Staubebegibiss bij virus tijdens het wisselen tand email aangetast, tanden bruine kleur met email effecten.
Hard Pat Disease Ontdekt 1948		Idem Carré Voetzolen/neusspiegel hard door sterke vereelting, voetzolen gevoelig aantasting zenuwstelsel, krampen, epileptische aanvallen.		5/6 weken 12 weken elk jaar	Aangenomen: Hard pat is speciale vorm van Carré
Hepatitis Contagiosa Canis ( HCC) (leverziekte) Ontdekt 1947 Rubarth	Bij honden & vossen. Bij begin van de infectie het speeksel. Aan het einde van de ziekte zowel als kort na de ziekte is ook de urine besmettelijk	Temperatuur stijging en schommelingen. Hoesten, keelontsteking vochtige ogen minder eetlust, braken en diarree, troebel hoornvlies lever: vertraagde bloedstolling	Inspuiten serum	Vaccin in combinatie met Carré.	Samen met Carré dodelijk.
Kennelhoest	Virus slaat toe na beschadiging slijmvliezen door veel blaffen of janken.	Droge kuch, braakneigingen, bronchitis, longemfyseem, secundair: longontsteking	antibiotica tegen secundaire infecties, hoestdrank voor slijmvliezen, veel frisse lucht, eventueel isolatie.	vaccin indien nodig. beschermt niet volledig!	Incubatietijd 10 dagen
Parvo-virus Voor het eerst in 1978 explosie van gevallen.	via lichaamsvocht en ontlasting.	Heftige bloederige diarree, bloedbraken, maag/darm ontstekingen, darmbloedingen, groot vochtverlies Pups: aantasting hartspier, hartstilstand.	vocht per infuus en symptoom bestrijding	Ieder jaar	Gemuteerd kattenvirus. Coronavirus lijkt op Parvo (waarschijnlijk een mutatie) tegelijk voorkomend is de combinatie dodelijk
Ziekte van Aujezsky ontdekt begin 1900 bij honden in Nederland in 1957	Via inademen Eten van besmet varkensvlees of afval Contact varkensmest Drinken besmet water	Lichte buikpijn lusteloosheid lichte diarree ontstoken weefsel van hersenen en ruggenmerg overlijden	Niet behandelbaar	Preventief enten is mogelijk, maar moet vaak herhaald worden, niet 100% dekkend	Varkensvirus
Rabiës\Hondsdolheid besmetting door marterachtige roofdieren, die zelf niet ziek worden	door speeksel, door bijten komt het besmette speeksel in de bijtwond, of op andere manier via speeksel	Stadium melancholicum: karakterverandering, virus van hersenen naar speekselklieren. (besmettelijk) Stadium: Excistatie:	Meteen na de beet laten enten, wond openen en bloed weg laten lopen. Daarna wond goed uitwassen	1 maand voordat de hond naar het buitenland gaat Verder jaarlijks enten.	Wettelijke regels: Met rabiës: doden. Verdacht: doden of quarantaine. Incubatie tijd:

		vlagen woeste opwinding ogen/ stem aangetast vallen zomaar aan, onzeker lopen, watervrees Stadium Paralyticum: Neerslachtig, verlammingen, veel kwijlen, verlamming onderkaak, overlijden		In besmette gebieden verplicht gesteld door de regering	tussen 10 dagen en een 1/2 jaar. Hoge Uitzonderingen zelfs een jaar
--	--	---	--	---	---

<b>BACTERIËN</b>	<b>BESMETTING</b>	<b>VERSCIJNSELEN</b>	<b>BEHANDELING</b>	<b>OPMERKINGEN</b>
Salmonella	Eten van rauwe kip, eten van rauwe eieren	Darminfectie/diarree, meestal weinig andere verschijnselen.	Antibiotica	Veel voorkomend, maar ± 25 soorten pathogeen.
Clostridium Botulisme	Voedsel in blik of weckflessen, vermeerderd zich zonder zuurstof	Verlammingen, verstikkingsdood	Is hier iets weggevallen?	Produceert toxinen die de verschijnselen veroorzaken. Boven 20 graden bij watervogels <b>bij...is hier iets weggevallen???</b>
Clostridium Tetanus	Vuile hondentanden, straatvuil, verontreinigde aarde, verspreidt zich vanuit een wondje met korst.	Ernstige krampen, steltachtige gang, stijve houding van het hoofd, angstige blik, gefronst voorhoofd, onderkaak geklemd	Antibiotica, wonden grondig reinigen en desinfecteren, Tetanus injectie met antiserum, verzorgen in warme, donkere rustige kamer.	Produceert toxinen die de verschijnselen veroorzaken.
Staphylococcen	Via besmet voedsel, besmetting via huid	Darmaandoeningen, misselijkheid, braken, etterige huidontsteking. Toxinen in bloedbaan: Aantasting hersenen, zeer ziek/slap, lusteloos, koorts, overlijden	Medicamenteuze therapie en Antibiotica	Vormen toxinen, maar NIET bij lage temperaturen.
Leptospirose Ziekte van Weil (Leptospira Canicola)	Via besmette urine. Vochtige bodems en verontreinigd voedsel beet knaagdier	Koude rillingen, koorts, verminderde eetlust, aantasting lever en milt veroorzaakt geelzucht, braken, overlijden.	Antibiotica	Vaccinatie:, daarna na 2-6 weken nogmaals verder elk half tot heel jaar.
Babesiosis (Piroplasmosis)	Door teken en protozo Babesis Canis	Hoge koorts, vermageren, lusteloos, bloed in urine, geelzucht, vergroting milt, vernietiging rode bloedcellen	Medicamenteus	Meestal in warme landen. De honden daar hebben een natuurlijke afweer. Vaccinatie: 1 <sup>ste</sup> enting, snel daarna 2 <sup>de</sup> enting, daarna ieder half tot heel jaar.