



Met een kritische blik kijken naar vaccinaties

Voor de lezers van onze website is een overzicht verzameld van de discussie over vaccinaties. Hieronder treft u een samenvatting.

Sinds november 2006 is in Nederland de driejarige registratie van het merk Nobivac van de firma Intervet er door. Deze registratie was al een aantal jaren in Amerika van kracht. Dit houdt in dat de drie virale vaccins uit de cocktail elke drie jaar gevaccineerd kunnen worden: Parvo, Distemper (Hondenziekte) en HCC (Leverziekte). Naast de drie virale vaccins, is ook de Rabiës vaccinatie geregistreerd voor drie jaar. Dit zijn regulier in Nederland levende entstoffen. Sinds de zomer van 2008 is ook het merk Vanguard van Pfizer geregistreerd voor drie jaar! Ook hier gaat het om de virale vaccins. Die driejarige registratie is er gekomen, omdat bewezen is dat de titerwaardes binnen die drie jaar hoog genoeg zijn bij zeer veel dieren. Alles wat je binnen die termijn extra vaccineert, kan ten eerste je hond schade toebrengen en ten tweede doet de vaccinatie niet wat het moet doen als de titers nog hoog genoeg zijn. Het is belangrijk dat zowel Intervet als Pfizer hiermee los komen en nog belangrijker dat alle dierenartspraktijken die van de driejarige registratie allang op de hoogte zijn gebracht, ook hierin mee gaan. Dierenartspraktijken zijn door Intervet sinds 2006 op de hoogte van dit gewijzigde vaccinatiebeleid. Het driejaarlijks vaccineren met de virale vaccins is een zeer veilig advies en verdient de voorkeur boven het jaarlijks en tweejaarlijks vaccineren. Dit om de vele vaccinosis gevallen bij huisdieren terug te dringen. En niet in de laatste plaats om fokdieren te beschermen tegen het leed dat vaccinatieschade heet. Alles wat je meer vaccineert, is onnodig schade toebrengen aan je dier. Sinds een aantal jaren bestaat er in Nederland de mogelijkheid om te titeren. In Amerika en Canada wordt titerbepaling al veel langer uitgevoerd en is zeer betrouwbaar gebleken. Dit titeren kan al vanaf 9-12 weken en 1 jaar, waardoor een duidelijk beeld kan worden verkregen of het wel of niet 'nodig' is te hervaccineren met de virale vaccins. Dat hervaccineren hoeft dan niet per definitie met een cocktail, maar kan nog veel meer verantwoord op maat.

De vaccins zijn:

- ◆ Parvo (los vaccin)
- ◆ Puppy DP (Parvo en Distemper (hondenziekte) OOK voor volwassen honden!)
- ◆ DHP (Distemper)
- ◆ HCC (leverziekte)
- ◆ en Parvo
- ◆ en eventueel Rabiës.

Wil je gebruik maken van deze zeer diervriendelijke titermethode(zie hieronder uitleg), dan vind je hieronder een lijst met dierenartsen die de titerbepaling uitvoeren. Het gemiddelde bedrag voor een uitgebreide titerbepaling ligt rond ca. €50,- en €55,-.

Vraag bij NML Health op welke dierenarts in jouw regio de VacciCheck gebruikt. Zie ook de tekst in Hondenmanieren van Tannetje de Koning.

Dode entstoffen zitten in:

- ◆ het Leptospirose (Weil) vaccin
- ◆ het Kennelhoest Bordetella nr. 8 vaccin
- ◆ het Para-influenza vaccin.

De laatste twee vaccinaties vormen een zeer verwaarloosbaar risico als je besluit ze niet te geven aan je huisdier. Het vaccin Leptospirose is erg discutabel op het moment. Uit onderzoeken blijkt dat de effectieve werking maar 3 maanden duurt en na 6 maanden sterk afbouwt. Ook is bekend dat bij veel honden de vaccinatie niet aanslaat. De risico's van de ernstige bijwerkingen uit deze vaccinatie wegen vele malen zwaarder dan het eventuele risico dat een hond daadwerkelijk Weil/Lepto zal oplopen en 100% bescherming biedt dat hij niet ziek of zelfs dood gaat. Die garantie is er absoluut niet als je wel vaccineert. Er wordt zelfs sterk ontraden 2x per jaar te vaccineren, iets wat door dierenartsen hier in Nederland wel vaak wordt aanbevolen. Die keuze laten wij aan jezelf over. Onderaan deze pagina vind je in de artikelsectie de onderzoeken die aan de werking en bijwerkingen van het Leptospirose vaccin c.q. de virale vaccinaties refereren.

O.a. de Amerikaanse virologe dr. Jean Dodds en dierenarts Tannetje de Koning (die zich enorm heeft verdiept in de werking van vaccinaties), zetten zich in voor honden met vaccinatieschade. Tannetje de Koning geeft bovendien in Nederland en België diverse lezingen hierover en spreekt op diverse symposia.

Bijwerkingen op immuunsysteem

Beide dierenartsen adviseren de vaccins met de heftigste bijwerkingen apart van elkaar te vaccineren in verband met hevige triggers van de verschillende vaccins die (auto-)immuunziektes (kunnen) veroorzaken. Zo triggert het Leptospirose-vaccin enorm op het Distemper-vaccin. En het Rabiës-vaccin werkt flink in op het HCC-vaccin en het Leptospirose-vaccin.

Daarom is het aan te bevelen om de vaccins DHP of Puppy DP en Leptospirose minimaal 6 weken na elkaar te vaccineren en de Rabies niet tezamen met het Leptospirose-vaccin en/of de DHP c.q. Puppy DP te vaccineren.

Het is verstandig om honden met epilepsie of (auto-)immuunziektes helemaal niet te vaccineren. De laatste 10 jaren is het aantal epilepsiehonden angstwekkend gestegen. Overvaccineren en doorfokken met foute combinaties zijn daar een belangrijke oorzaak van.

Geen zieke dieren vaccineren

Een hond die ziek is (diarree, braken of wat dan ook) en tegen zijn vaccinatiedatum aanzit, mag NOOIT in die staat worden gevaccineerd. Wacht eerst tot het dier volledig beter is en stel het minimaal een aantal weken uit. Ook is het niet verstandig

tegelijkertijd met de vaccinatie te ontwormen en/of vlo- en teekbestrijdingsmiddelen toe te dienen. Dit mag NOOIT gelijktijdig gebeuren. Honden op Antibiotica-kuren of die dat moment andere zware medicatiebehandelingen ondergaan, mogen ook NOOIT gelijktijdig worden gevaccineerd en ontwormd en vlo- en teekbestrijdingsmiddelen krijgen toegediend. Dit zijn DE momenten waarop je een hond met vaccinatieschade mee terug naar huis neemt en helaas zijn er erg weinig dierenartsen die daar bijilstaan.

Voedseladvies

Dat Natural Raw Feeding bijdraagt aan het versterken van het immuunsysteem is al bij veel dieren een vaststaand feit gebleken. Dan kun je bediscussiëren na het lezen van deze pagina en eventueel de rest van de website, dat wij promoten dat alles valt op te lossen met een natuurlijk rauw dieet. NEE, maar het zorgt wel dikwijls voor een optimaal functionerend metabolisme en dat is waar het bij veel honden op brokvoeding of te koolhydraatrijke verhitte voeding aan ontbreekt als het moet opboksen tegen de eerdergenoemde gevaren.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de werking van vaccinaties, risico's van vaccinatieschade, vaccinatieonderzoeken en alle voors en tegens op een rij? Hieronder vind je interessante informatie van o.a. Dr. Jean Dodds die samen met Dr. R. Schultz al vele belangrijke onderzoeken en bevindingen op hun naam hebben staan. In Europa, maar zeker ook wereldwijd, worden steeds meer van hun aanbevelingen opgevolgd.

Rol van fokkers en rasverenigingen

Het zou ten goede komen aan met name de rashondenfokkerij als de adviezen van deze zeer belangrijke deskundigen door de rasverenigingen worden overgenomen en worden erkend door de Nederlandse (diergeneeskundige) faculteiten die bijvoorbeeld het bekende driejaarlijkse vaccineeradvies dat Intervet (Nobivac) in 2006 al heeft afgegeven, nog steeds tegenhouden en de waarde van titerbepalingen niet erkennen en zwaar onderschatten.

Aanvullende informatie

- Belangrijk om in de gaten te houden, is dat als de titer bij een hond al hoog genoeg is, het dier niet alleen beschermd is, maar de vaccinatie ook niets meer toevoegt. Een hoge titer wordt niet hoger. Vaccineren is dan niet alleen weggegooid geld maar ook een onnodig risico op bijwerkingen. Hetzelfde geldt voor pups. Dat we pups zo vaak vaccineren is niet omdat die vaccins zo slecht werken. Zolang de pup nog antilichamen van de moeder in zijn bloed heeft, slaat een vaccinatie niet aan. Dus ergens tussen de zes en de twaalf weken, is er één van de drie tot vier vaccinaties die effectief is. De rest dus niet.

- Doordat het immuunsysteem heel hard aan het reageren is om genoeg antilichamen te maken, heeft het geen tijd om andere dingen te doen. Zo wordt geregeld gezien dat na een vaccinatie een ontsteking optreedt, bijv. kennelhoest of diarree. Ook tumoren die wel al aanwezig waren, maar nog niet ontdekt, kunnen ineens de kop opsteken. Door toevoegingen aan de entstof kunnen allergische reacties optreden, zoals zwelling op de plaats van de enting tot ernstiger reacties tot aan shock en dus overlijden van het dier. Ook kan het immuunsysteem dusdanig geprikkeld raken dat het niet meer weet wat lichaamseigen cellen zijn en wat niet. Inmiddels wordt algemeen erkend dat AIHA kan worden veroorzaakt door een enting. Maar ook bij andere auto-immuunziekten bestaat het vermoeden dat het door vaccinaties kan worden veroorzaakt.
- Over de Leptospirose stond nog het volgende: Behalve dat de bijwerkingen ernstiger zijn, omdat het een dood vaccin betreft, waar ook nog een prikkelende stof inzit om het immuunsysteem aan het werk te zetten, speelt nog mee dat er meerdere ondersoorten van Leptospiren zijn. In de entstof zitten twee soorten Leptospira die veel voorkomen, maar onbekend is of dat nu nog steeds zo is. In Duitsland en Italië komen vaker ondersoorten voor, dus we weten niet hoe effectief deze enting is in het voorkomen van deze ziekte.

Verzamelde literatuur en zelf verder googlen

- Dr. Jean Dodds Seminar mei 2009
- New Vaccin Protocol 2009-Dr. Jean Dodds
- Veel gestelde vragen aan Dr. Jean Dodds
- Lezing dierenarts Tannetje Koning: 28-02-2008
- Wat dierenartsen u niet over vaccins vertellen - Catherine O'Driscoll
- Rabies - 5-7 jarige immuniteit
- Vaccinatieschema Nobivac
- Vaccins - Catherine O'Driscoll
- Dr. Schulz vaccinatieonderzoek
- Report of the AAHA; vaccinatieonderzoek
- Vaccinatie reacties
- De nadelige gevolgen van vaccineren
- Nosodes Leptospirosis (Weil) zeer succesvol toegepast bij mensen
- 31 dierenartsen in strijd tegen over vaccineren van huisdieren
- Vaccinatieschade en epilepsie
- Vaccineren - de tijden zijn veranderd

Dagopvang en vakantieadressen

Uiteraard dient u uw dier goed en voldoende te vaccineren indien u regelmatig gebruik maakt van een hondencrèche of uw hond onderbrengt in een pension bij vakanties. Deze stellen elk variërend, eisen aan de inenting. Informeert u zich tijdig over welke inenting verplicht gesteld worden.